転ばない
元気に働き続ける
「からだ」作り
しませんか？

転んでいませんか？

誰でも転びます

七転び八起き

転倒→受傷

転倒予防 = 高齢者！？

本日のメニュー

- ① 転倒のお話・統計
- ② 転倒予防に必要な3つの感覚
目・耳・足
- ③ 転倒予防につながる体操

① 転倒のお話・統計

要介護度別にみた介護が必要となった主な原因（上位3位）

(単位:%)

現在の要介護度	第1位		第2位		第3位	
	原因	割合	原因	割合	原因	割合
総数	認知症	17.6	脳血管疾患(脳卒中)	16.1	高齢による衰弱	12.8
要支援者	関節疾患	18.9	高齢による衰弱	16.1	骨折・転倒	14.2
要支援1	関節疾患	20.3	高齢による衰弱	17.9	骨折・転倒	13.5
要支援2	関節疾患	17.5	骨折・転倒	14.9	高齢による衰弱	14.4
要介護者	認知症	24.3	脳血管疾患(脳卒中)	19.2	骨折・転倒	12.0
要介護1	認知症	29.8	脳血管疾患(脳卒中)	14.5	高齢による衰弱	13.7
要介護2	認知症	18.7	脳血管疾患(脳卒中)	17.8	骨折・転倒	13.5
要介護3	認知症	27.0	脳血管疾患(脳卒中)	24.1	骨折・転倒	12.1
要介護4	脳血管疾患(脳卒中)	23.6	認知症	20.2	骨折・転倒	15.1
要介護5	脳血管疾患(脳卒中)	24.7	認知症	24.0	高齢による衰弱	8.9

注：「現在の要介護度」とは、2019（令和元）年6月の要介護度をいう。

65歳以上の要介護者等の介護が必要となった主な原因

参考資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成28年）

65歳以上の要介護者等の介護が必要となった主な原因

参考資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」

労災に増える高齢者 目立つ「転倒」4割近くが60歳超

<https://www.asahi.com/articles/ASM5K3V90M5KULFA00T.html>

転倒予防 = 健康で働き続ける

転倒リスクチェックシート

次のチェック表でどんな転倒のリスクをかかえているのか確認し、
最小限の対策をとれるようにするもの

(厚生労働省監修「介護予防テキスト」より)

1	この1年間に転倒した
2	横断歩道を青信号の間に渡りきることができない
3	1kmぐらいを続けて歩くことができない
4	片足で立ったまま靴下をはくことができない
5	水でぬれたタオルや雑巾をきつく絞ることができない
6	この1年間に入院したことがある
7	立ちくらみがすることがある
8	今までに脳卒中を起こしたことがある
9	今までに糖尿病といわれたことがある
10	睡眠薬、降圧剤、精神安定剤を服用している
11	日常、サンダルやスリッパをよく使う
12	家の中でよくつまずいたり、すべったりする
13	(新聞や人の顔など)目があまりよく見えない
14	(会話など)耳があまりよく聞こえない
15	転倒に対する不安は大きい、あるいは転倒が怖くて外出を控えることがある

(厚生労働省監修「介護予防テキスト」より)

② 転倒予防に必要な3つの感覚
目・耳・足

③ 転倒予防につながる体操

Q あなたはどんな姿勢・歩き方をしている？

姿勢をコントロールしているのは

年齢とともに…

視力は大切！調整を！

静止視力（利き目視力）
を転倒群と非転倒群の2群
で比較したところ、転倒
群では有意に静止視力が
低かった ($p < 0.05$)

視力が低下している人は
転びやすい！

高齢者の転倒に関する視覚機能の検討

Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学会大会 抄録集)

振り向くことができますか？

振り向く→ふらつく

姿勢制御における前庭覚（耳
の奥にある器官）が強く関与

70歳
前庭の神経細胞
40%機能低下

眼球運動+頸部運動が大切

地域在住健康高齢者に対する前庭リハビリテーションがバランス能力に及ぼす影響

P1-A34 九州理学療法士・作業療法士同学会 2016

加齢によって足底感覚が低下する

加齢による閾値上昇率

20歳の方と
比べて
65歳以上の方
の方が感じにくくなる

参考 タッチ：岩村吉晃 著 医学書院 2001

後ろ歩きができなくなってくる

足底 触圧覚閾値の上昇
= 足の感覚が鈍い人は

特に後方歩行時間が延長

足底感覚の低下が
後方へ移動することに恐怖
や苦手意識をつけていく

糖尿病患者における足底触圧覚が後方歩行に及ぼす影響

保健医療学雑誌 9 (1): 25-30, 2018

フットケアは重要

ヤスリがけ、足浴、
マッサージ、足の運動
4つのフットケア

6週間実施

足部の問題の改善、
立位バランスや歩行機能向上

在宅高齢者におけるフットケアの効果の継続性 —ケア終了6ヶ月後の追跡調査から—

日本赤十字九州国際看護大学紀要第10号 (2011年12月)

片足立ちができれば転びにくい

下肢筋力増強は転倒予防
に有効

特に股関節外転筋
(足を外に広げる力)
が片足立ちを行いやすく
する

下肢筋力訓練は転倒予防に効果があるか？

Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学会大会 抄録集)

足腰の力が大切です！

転ばないように戦略がある

足腰・脳も刺激し続けること

転倒予防 = 健康で働き続ける

からだところのメンテナンススペース あし...

姿勢（態度）が変われば人生が変わる

からだの見た目（印象や）が変わる
物事への取り組み方（姿勢）が変わる

その結果...

EOS

施術やミニ講座などを行なっています（出張可能）お気軽にお問い合わせください